

Información para el paciente

GIOXIL-36®

capsulas

Lea esta información importante antes de comenzar a tomar GIOXIL-36 y cada vez que renueve la receta. Es posible que haya información nueva. También podría resultarle útil compartir esta información con su pareja. Esta información no reemplaza la comunicación con su médico. Usted y su médico deben hablar acerca de GIOXIL-36 cuando empiece a tomarlo y durante los controles regulares. Si no entiende la información o tiene preguntas, consulte a su médico o a su farmacéutico.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de GIOXIL-36? GIOXIL-36 puede producir una baja súbita de la tensión arterial a un nivel inseguro si se toma con algunos otros medicamentos. Podría marearse, desmayarse o sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.

No tome GIOXIL-36 si **toma cualquiera de los medicamentos llamados “nitratos”**. Los nitratos se utilizan con frecuencia para el tratamiento de la angina de pecho. La angina de pecho es un síntoma de cardiopatía, y podría provocarle dolor en el pecho, en la mandíbula o en el brazo.

- Entre los medicamentos llamados nitratos está la nitroglicerina que se encuentra en comprimidos, aerosoles, ungüentos, pastas o parches. También podrá encontrar los nitratos en otros medicamentos, tales como el dinitrato de isosorbida o el mononitrato de isosorbida. Algunas drogas recreativas de inhalación llamadas “reventadores” o “poppers” también contienen nitratos, como nitrito de amilo y nitrito de butilo.
- Si no está seguro de que alguno de sus medicamentos sea un nitrato, consulte a su médico o a su farmacéutico.

(Consulte “**¿Quién no debe tomar GIOXIL-36?**”)

Informe a todos sus médicos que está tomando GIOXIL-36. Si necesitara atención médica urgente por un problema cardíaco, sería importante que su médico supiera cuándo fue la última vez que usted tomó GIOXIL-36.

Después de tomar un solo comprimido, parte del ingrediente activo de GIOXIL-36 permanece en su organismo durante más de 2 días. El ingrediente activo puede permanecer más tiempo si tiene usted problemas renales o hepáticos, o si está tomando ciertos medicamentos (consulte “**¿Pueden otros medicamentos afectar a GIOXIL-36?**”). Suspenda la actividad sexual y procure obtener ayuda médica de inmediato si siente síntomas tales como dolor de pecho, mareos o náuseas durante las relaciones sexuales. La actividad sexual puede exigir un mayor esfuerzo a su corazón, en especial si éste ya estuviera débil a causa de un infarto o una cardiopatía.

Consulte también “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GIOXIL-36?”.

¿Qué es GIOXIL-36?

GIOXIL-36 es un medicamento recetado que se toma por boca para el tratamiento de la disfunción eréctil (DE) en los hombres.

La DE es una afección en la que el pene no se llena con la sangre suficiente como para endurecerse y agrandarse cuando el hombre está excitado sexualmente, o en la que no puede mantener una erección. El hombre que tiene problemas para tener o mantener una erección debe consultar al médico para obtener asesoramiento, si la afección le molesta. GIOXIL-36 puede ayudar a aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene, y puede también ayudar a los hombres con DE a lograr y mantener una erección satisfactoria para la actividad sexual. Una vez que el hombre haya finalizado la actividad sexual, el flujo sanguíneo hacia el pene disminuye y la erección desaparece.

Es necesario algún tipo de estímulo sexual para que tenga lugar una erección habiendo tomado GIOXIL-36.

GIOXIL-36 no:

- cura la DE
- aumenta el deseo sexual de un hombre
- protege al hombre ni a su pareja de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

Consulte a su médico acerca de las maneras de protegerse de las enfermedades de transmisión sexual.

- funciona como anticonceptivo masculino

GIOXIL-36 es sólo para hombres mayores de 18 años con DE, inclusive hombres con diabetes o que se hayan sometido a una prostatectomía.

GIOXIL-36 no es para mujeres ni para niños.
Sólo debe tomarse GIOXIL-36 bajo control médico.

¿Quién no debe tomar GIOXIL-36?

NO tome GIOXIL-36 si:

- toma cualquiera de los medicamentos llamados “nitratos”.
- consume drogas recreativas de inhalación llamadas “reventadores” o “poppers”, como el nitrito de amilo y el nitrito de butilo.

(Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de GIOXIL-36?”.)

¿Qué debo informar a mi médico antes de tomar GIOXIL-36?

GIOXIL-36 no es adecuado para todo el mundo. **Sólo su médico y usted pueden decidir si**

GIOXIL-36 es adecuado para usted. Antes de tomar GIOXIL-36, comuníquese a su médico todos sus problemas de salud, incluso si usted:

- **Es alérgico a GIOXIL-36 o ADCIRCA™ o a cualquiera de sus ingredientes.** Consulte el final de este folleto para ver una lista completa de los ingredientes de GIOXIL-36.
- **Tiene problemas cardíacos** tales como angina de pecho, insuficiencia cardíaca, latidos irregulares o si ha tenido un infarto de miocardio. Pregunte a su médico si es seguro para usted tener actividad sexual. No debe tomar GIOXIL-36 si su médico le ha dicho que no tenga actividad sexual debido a sus problemas de salud.
- **Tiene tensión arterial baja o tensión arterial alta** que no está controlada.
- **Ha sufrido un accidente cerebrovascular.**
- **Tiene problemas hepáticos.**
- **Tiene problemas renales o necesita diálisis.**
- **Tiene retinitis pigmentosa**, una enfermedad ocular genética (de familia) poco frecuente.
- **Alguna vez ha sufrido una pérdida grave de la visión, incluida una afección llamada NAION.**
- **Tiene úlceras estomacales.**
- **Tiene un problema hemorrágico.**
- **Tiene el pene deforme** o padece la enfermedad de Peyronie.
- **Tuvo una erección que duró más de 4 horas.**
- **Tiene problemas de células sanguíneas**, como anemia de células falciformes, mieloma múltiple o leucemia.

¿Pueden otros medicamentos afectar el uso de GIOXIL-36?

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que esté tomando, incluidos medicamentos con receta o de venta libre, vitaminas y complementos de hierbas. Es posible que GIOXIL-36 y otros medicamentos se afecten entre sí. Consulte siempre a su médico antes de comenzar a tomar o dejar de tomar cualquier medicamento. Informe especialmente a su médico si toma cualquiera de los siguientes medicamentos:*

- Medicamentos llamados nitratos

(consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de GIOXIL-36?”).

- Medicamentos llamados alfabloqueantes. Entre ellos se incluyen Hytrin® (terazosina HCl), Flomax® (tamsulosina HCl), Cardura® (mesilato de doxazosina) Minipress® (prazosina HCl) o Uroxatral® (alfuzosina HCl). A veces se recetan alfabloqueantes para problemas de próstata o tensión arterial alta. Si se toma GIOXIL-36 con ciertos alfabloqueantes, la tensión arterial puede bajar abruptamente. Podría marearse o desmayarse.

- Otros medicamentos para tratar la tensión arterial alta (hipertensión).
- Medicamentos llamados inhibidores de la proteasa del VIH, como el ritonavir (Norvir®, Kaletra®)
- ketoconazol (Nizoral®)
- itraconazol (Sporanox®)
- eritromicina
- Otros medicamentos o tratamientos para la DE.

- GIOXIL-36 también se comercializa como ADCIRCA para el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar. No tome GIOXIL-36 y ADCIRCA juntos. No tome citrato de sildenafil (Revatio™) con GIOXIL-36.

¿Cómo debo tomar GIOXIL-36?

- Tome GIOXIL-36 tal como se lo indique su médico. Su médico le recetará la dosis indicada para usted.
- Algunos hombres sólo pueden tomar una dosis baja de GIOXIL-36, o quizá deban tomarlo con menos frecuencia, debido a sus afecciones o a los medicamentos que toman.
- No cambie su dosis de GIOXIL-36 ni la forma en que lo toma sin consultar al médico. El médico podrá disminuir o aumentar su dosis, según la reacción de su organismo al GIOXIL-36 y su estado de salud.
- GIOXIL-36 puede tomarse con o sin comida.
- Si toma demasiado GIOXIL-36, llame a su médico o a una sala de emergencia inmediatamente.

Hay dos formas de tomar GIOXIL-36:

GIOXIL-36 para consumir según se necesite:

- **No tome GIOXIL-36 más de una vez por día.**
- Tome un comprimido de GIOXIL-36 antes de la posible actividad sexual. Podrá tener actividad sexual 30 minutos después de tomar GIOXIL-36 y hasta 36 horas después de haberlo tomado.

Usted y su médico deben tomar esto en cuenta al decidir con cuánta antelación a la actividad sexual debe tomar GIOXIL-36. Es necesario algún tipo de estímulo sexual para que tenga lugar una erección habiendo tomado GIOXIL-36.

- Su médico podrá cambiar su dosis de GIOXIL-36 dependiendo de su respuesta al medicamento y de su estado de salud.

GIOXIL-36 para usar una vez al día:

- **No tome GIOXIL-36 más de una vez por día.**
- Tome un comprimido de GIOXIL-Daily cada día, aproximadamente a la misma hora. Podrá intentar tener actividad sexual en cualquier momento entre las dosis.
- Si se saltea una dosis, podrá tomarla cuando recuerde hacerlo, pero no tome más de una dosis por día.
- Es necesario algún tipo de estímulo sexual para que tenga lugar una erección habiendo tomado GIOXIL- Daily.
- Su médico podrá cambiar su dosis de GIOXIL- Daily dependiendo de su respuesta al medicamento y de su estado de salud.

¿Qué debo evitar mientras esté tomando GIOXIL-36?

- No tome otros medicamentos para la DE ni tratamientos para la DE mientras esté tomando GIOXIL-36.
- No tome bebidas alcohólicas en exceso mientras esté tomando GIOXIL-36 (por ejemplo, vasos de vino o 5 tragos de whisky). Cuando se toma en exceso, el alcohol puede aumentar la probabilidad de padecer dolor de cabeza o de marearse, de acelerar la frecuencia cardíaca o de bajar la tensión arterial.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GIOXIL-36?

Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de GIOXIL-36?”.

Los efectos secundarios más comunes de GIOXIL-36 son: dolor de cabeza, indigestión, dolor de espalda, dolores musculares, rubor y congestión nasal o rinorrea. Por lo general, estos efectos secundarios desaparecen después de algunas horas. Los hombres que sufren dolores de espalda y musculares, suelen padecerlos de 12 a 24 horas después de tomar GIOXIL-36. Los dolores de espalda y musculares suelen desaparecer en el transcurso de 2 días. Llame a su médico si sufre algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece.

Entre los efectos secundarios poco frecuentes se incluyen:

Una erección que no desaparece (priapismo). Si tiene una erección que dura más de 4 horas, obtenga asistencia médica de inmediato. El priapismo debe tratarse lo más pronto posible, ya que se corre el riesgo de sufrir un daño permanente en el pene, incluida la incapacidad de tener erecciones.

Cambios de visión, por ejemplo, ver los objetos con un tinte (tono) azul o tener dificultad para diferenciar entre el azul y el verde.

En ocasiones muy poco frecuentes, se observó una súbita disminución o pérdida de visión en uno o en ambos ojos en hombres que tomaron inhibidores de PDE5 (medicamentos orales para la disfunción eréctil, incluido GIOXIL-36). Es imposible determinar si estos acontecimientos están directamente vinculados con estos medicamentos o con otros factores como tensión arterial alta o diabetes, o con una combinación de los mismos. Si usted sufre una disminución o una pérdida súbita de la visión, deje de tomar inhibidores de PDE5, incluido GIOXIL-36, y llame a un médico inmediatamente.

En casos excepcionales, se observó una pérdida o disminución súbita de la audición, a veces acompañada de tintineo en los oídos y mareos, en hombres que tomaron inhibidores de PDE5, incluido GIOXIL-36. Es imposible determinar si estos acontecimientos están directamente vinculados con los inhibidores de PDE5, con otras enfermedades o medicamentos, con otros factores o con una combinación de factores. Si padeciera estos síntomas, deje de tomar GIOXIL-36 y póngase en contacto con un médico inmediatamente. Éstos no son todos los efectos secundarios posibles de GIOXIL-36.

Para obtener información adicional, consulte a su médico o a su farmacéutico.

¿Cómo debo guardar el GIOXIL-36?

Guarde el GIOXIL-36 a temperatura ambiente entre 59° y 86°F (15° y 30°C).

Mantenga el GIOXIL-36 y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general acerca de GIOXIL-36:

A veces se recetan los medicamentos para afecciones distintas a las descritas en los folletos de información para los pacientes. No use GIOXIL-36 para una afección para la cual no ha sido recetado. No dé GIOXIL-36 a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Podría perjudicarlas.

Este es un resumen de la información más importante acerca de GIOXIL-36. Si desea tener más información, hable con su médico. Puede pedir a su médico o a su farmacéutico que le facilite información acerca de GIOXIL-36 redactada para profesionales sanitarios. Para obtener información adicional, también puede entrar en www.GIOXIL-36.com

¿Cuáles son los ingredientes de GIOXIL-36?

Ingrediente activo: : Lepidium meyenii (Maca root) 200mg, Ptychopetalum olacoides - Root (Muirá puama)20mg and Hydroxyhomosildenafil 20mg

GIOXIL-36® es una marca registrada de FIRSTMED PHARMA, INC.

*Las marcas nombradas son marcas comerciales de sus propietarios respectivos y no son marcas comerciales de FIRSTMED PHARMA, INC. Los fabricantes de estas marcas no están afiliados con FIRSTMED PHARMA, INC y no respaldan a la empresa ni a sus productos.

Rx only

GIOXIL-36® is a registered trademark of FIRSTMED PHARMA, INC.

*The brands listed are trademarks of their respective owners and are not trademarks of FIRSTMED PHARMA, INC. The makers of these brands are not affiliated with and do not endorse FIRSTMED PHARMA, INC or its products.

Literature revised July 12, 2009

FIRSTMED PHARMA, INC

Dothan, AL 36301, USA

www.GIOXIL-36.com

Copyright © 2003, 2009, Firstmed Pharma Inc.. All rights reserved.

PRINTED IN USA